

PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI DE MINAS – MG

MÉDICO PEDIATRA

Nome do(a) Candidato(a)	Número de Documento
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Língua Portuguesa	10
Conhecimentos Específicos	10
Total de questões	20

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):

- Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
- Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões completo ao fiscal.
- Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço indicado na frente do cartão.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
- Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início..
- Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado, e o CADERNO DE QUESTÕES.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído.
- O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTA, BEM COMO NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
- O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.

Destaque aqui

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI DE MINAS- MG – MÉDICO PEDIATRA.

Marque aqui as suas respostas:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<input type="text"/>														
16	17	18	19	20	<input type="text"/>									
<input type="text"/>														

RASCUNHO

RASCUNHO

Leia a tirinha abaixo para responder a questão de número 1 e 2.



(Disponível em: <http://aescritanasentrelinhas.com.br/2011/02/21/interpretacao-de-tirinhas-calvin/>)

1) Sobre o humor da tirinha assinale a alternativa CORRETA.

- Calvin empenhar-se na construção de um raciocínio em prol da cobrança pelo desenho que ele mesmo fez.
- Após o longo discurso de Calvin, seu pai não pagar pelo valor solicitado.
- O pai não reconhecer o valor de 500 dólares pedido por Calvin.
- Nenhuma das alternativas.

2) No último quadrinho o pai de Calvin utiliza a locução “Ainda assim”, que é um conector de:

- Consequência.
- Adversidade.
- Concessão.
- Restrição.

Leia o texto abaixo para responder à questão de número 3.

Excesso de peso é responsável por 4% dos casos de câncer no mundo

Um relatório da Sociedade Americana do Câncer apontou que o excesso de peso foi responsável por cerca de 3,9% dos casos de câncer em 2012. Os autores do relatório afirmam que o número deverá crescer nas próximas décadas, dadas as tendências.

Sistemas políticos, econômicos, práticas de mercado que promovem o consumo de alimentos muito energéticos e pouco saudáveis e pouco tempo de atividade física estão aumentando os casos de pessoas com excesso de peso, diz o relatório.

Em 2016, aproximadamente 40% dos adultos e 18% das crianças e adolescentes apresentaram excesso de peso. O número cresceu em praticamente todos os países, mas os maiores aumentos foram em países subdesenvolvidos.

Em 2015, segundo o relatório, 4 milhões de mortes foram associadas ao excesso de peso. O impacto econômico destas mortes é estimado em 2 trilhões de dólares. Em 2012, o excesso de peso foi responsável por 544,300 casos de câncer, ou seja, 3,9% do total de casos da doença. Em países de baixa renda, a proporção variou

cerca de 1%, enquanto nos países de alta renda chegou a 7% ou 8%.

(Disponível em: (<https://exame.abril.com.br/ciencia/excesso-de-peso-e-responsavel-por-4-dos-casos-de-cancer-no-mundo/>) Adaptado)

3) O texto traz uma discussão sobre um importante tema da atualidade:

- Alertar a população a respeito das consequências que o excesso de peso pode trazer decorrentes da falta de atividade física e má alimentação.
- Prever que o número de mortes por excesso de peso pode diminuir se as pessoas praticarem atividades físicas e consumirem alimentos saudáveis.
- Afirmar que o excesso de peso é o único responsável pelo número de mortes por câncer em 2012.
- Ilustrar as consequências da má alimentação e da necessidade de praticar uma atividade física nos dias atuais.

4) De acordo com as regras de colocação pronominal, assinale a alternativa que preenche respectivamente as lacunas abaixo:

- “Olhos _____ cor ilumina o meu mundo.”
 - “O carro _____ motor tinha fundido foi rebocado.”
 - “O menino cometeu uma infração. _____ será calculada.”
 - “Diga-me _____ você vai, que irei contigo.”
 - “Essa é a menina _____ fez o teste.”
- cuja, que o, essa, aonde, cuja
 - cuja, cujo, esta, aonde, a qual
 - que a, que o, esta, onde, cujo
 - cujo a, cujo, essa, onde, a qual

5) A alternativa que reescreve o trecho: “Convém confiar a João esta responsabilidade.”, de acordo com a norma-padrão de emprego e colocação pronominal, é:

- Convém confiar-lhe esta responsabilidade.
- Convém confiá-lo esta responsabilidade.
- Convém o confiar esta responsabilidade.
- Convém confiar esta responsabilidade.

6) Observe a sentença: “E, aparecera como um clarão reluzente.” A forma verbal em destaque, pode ser substituída, sem prejuízo no seu significado, por:

- vinham aparecendo
- apareceu
- havia aparecido
- aparecia

7) Preencha corretamente as lacunas das sentenças e assinale a alternativa CORRETA quanto às regras do acento indicativo de crase:

- Reagirei _____ situação _____ qual estamos acostumados.
 - Nós iremos _____ galerias de arte contemporâneas.
 - _____ medida que eu estudo, aprendo mais.
 - Disse _____ aluna que a prova foi cancelada.
 - Você deve estar ciente de que terá de obedecer _____ normas.
- à...à, às, à, àquela, às
 - à...a, às, à, aquela, as
 - a...a, às, a, aquela, às
 - a...à, as, à, àquela, as

8) Assinale a alternativa em que há erro de regência, de acordo com a língua culta.

- a) Eu tinha trazido o livro.
- b) Se o governo mantiver o acordo, dará certo.
- c) Esqueci-me de você há muito tempo.
- d) Ele entrevistou nas nossas negociações.

9) Na sentença “O aluno preencheu com medo o gabarito da prova.” O termo em destaque exerce, na oração, a função sintática de:

- a) Objeto indireto.
- b) Complemento nominal.
- c) Predicativo do sujeito.
- d) Predicativo do objeto.

10) Observe as sentenças:

I- “Ele estava irritado porque o carro quebrou.”

II- “Choveu, embora estivesse marcando sol.”

III- “Ele foi tão sincero que conseguiu a vaga.”

IV- “Fez o serviço como a mãe orientou.”

As conjunções em destaque expressam valor semântico de oração subordinada adverbial:

- a) causal, concessiva, consecutiva, conformativa.
- b) explicativa, consecutiva, explicativa, conformativa.
- c) consecutiva, temporal, causal, final.
- d) causal, adversativa, explicativa, consecutiva.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) A doença de Crohn em crianças pode aparecer em qualquer idade, mas é mais incidente após os seis anos. Os sintomas são os mesmos da doença em adultos. Assinale a alternativa que corresponde aos sintomas:

- a) Os mais comuns são crises de dor abdominal, diarreia e febre.
- b) Os mais comuns são crises de dor abdominal, diarreia com sangramento .
- c) Os mais comuns são crises de dor abdominal, diarreia com sangramento e muco e febre, e outros sintomas.
- d) Os mais comuns são crises de dor abdominal e febre.

12) A doença de Crohn é um quadro autoimune e crônico, ou seja, que pode ser controlado, mas ainda não há cura. De difícil diagnóstico, diversas possibilidades devem ser descartadas para se chegar a uma conclusão final. Com relação ao diagnóstico é CORRETO afirmar:

- a) A doença de Crohn pode ser confundida com outras doenças, como síndrome do intestino irritável, alergias alimentares, intolerância à lactose, verminoses, gastroenterite aguda, colite ou inflamações induzidas por remédios ou agentes como a tuberculose e bactérias.
- b) A doença de Crohn pode ser confundida com outras doenças, como síndrome do intestino irritável, alergias alimentares e intolerância à lactose.
- c) A doença de Crohn pode ser confundida com outras doenças, como síndrome do intestino irritável, gastroenterite aguda e colite.
- d) Nenhuma das alternativas.

13) A Infecção no trato urinário é doença de grande incidência na infância , e pelo menos 1 episódio sintomático de ITU ocorre até os 11 anos de idade em 3% das meninas e 1,1% dos meninos . Há uma maior incidência de ITU no primeiro ano de vida. Após essa idade há redução acentuada da incidência nos meninos, mantendo-se relativamente alta nas meninas

até os seis anos A recorrência é elevada, cerca de 30% das meninas recidivam no primeiro ano após o episódio inicial, 50% em 5 anos e nos meninos isto ocorre em torno de 15 a 20%, sendo raras após o 1º ano de vida. Com relação aos sintomas de ITU nos primeiros anos de vida assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Geralmente um quadro séptico exibem um quadro menos agudo com recusa alimentar, ganho de peso insuficiente, vômitos e palidez cutânea. Há alto risco de bacteremia com possibilidade de óbito.
- b) A febre é a principal manifestação, raramente ocorrem sintomatologias específicas. Podem apresentar manifestações inespecíficas como baixo ganho de peso, hiporexia, vômitos, dor abdominal. Em serviços de urgência a prevalência está em torno de 3% de ITU nos lactentes com febre acima de 38,5°C de origem inexplicada.
- c) A febre é muito frequente, geralmente apresenta sinais e sintomas relacionados ao trato urinário. A presença de adinamia, febre alta, calafrios, dor abdominal e nos flancos sugere pielonefrite aguda
- d) Geralmente apresenta-se com disúria, polaciúria, dor à micção ou urgência miccional, hematúria e febre.

14) São malformações que aparecem lateralmente na região cervical. Podem ser identificadas já no recém-nascido por pequenos orifícios na projeção da borda anterior do músculo esternocleidomastoideo. Com relação as afecções cirúrgicas comuns da infância assinale a alternativa CORRETA:

- a) Anomalias branquiais.
- b) Torcicolo congênito.
- c) Cisto tireoglossal (CT).
- d) Nenhuma das alternativas.

15) A criança apresenta tosse seca ou produtiva, obstrução nasal, coriza e febre, causada por Adenovírus. Ao exame físico: roncocal, estertores, raros sibilos. Essa informação refere-se a:

- a) Bronquiolite.
- b) Rinofaringite Viral
- c) Traqueobronquite aguda
- d) Nenhuma das alternativas.

16) Relacione as colunas sobre algumas doenças dermatológicas na infância:

1- Estrófulo :

2- Impetigo Estreptocócico :

3- Intertrigo :

() Vesículas ou bolhas com conteúdo turvo, que se rompem facilmente, drenando líquido seropurulento e formando crosta amarelada (melicérica), localizadas em qualquer área do corpo e principalmente periorifical.

() Maceração nas áreas das dobras (retroauricular, axilar, inguinal) podendo infectar-se secundariamente (Candida sp, estafilococo ou estreptococo), causado por fricção e umidade.

() Pápulas eritematosas com vesícula no centro (seropápulas), pruriginosas, dispostas aos pares ou linearmente nas áreas expostas e de extremidades (mosquitos, pernilongos) ou cobertas (pulgas, ácaros). Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) 2-3-1.
- b) 1-3-2.

- c) 3-1-2.
d) Nenhuma das alternativas.

17) O tecido de granulação com secreção serosa e hemorrágica que aparece após a queda do cordão no fundo da cicatriz umbilical; tratamento: aplicar o bastão de nitrato de prata a 10% no fundo da lesão duas vezes ao dia até a cicatrização. O procedimento deve ser realizado pelo médico ou enfermeiro; cavalier a possibilidade de persistência do ducto onfalomesentérico ou do úraco se, após a regressão do granuloma, for observada a presença de líquido no umbigo. A informação acima refere-se a:

- a) Hérnia umbilical.
b) Granuloma umbilical.
c) Onfalite.
d) Nenhuma das alternativas.

18) A respeito de algumas doenças e medicamentos padronizados, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Doença: Ascaridíase; Idade/peso: Acima de 10 kg > de 2 anos; Medicamento: Mebendazol 100 mg/5ml Albendazol 400 mg; Posologia: 5 ml VO 12/12h 1 cp VO 3 a 5 dias; Duração: 3 a 5 dias Dose Única.
b) Doença: Ancilostomíase; Idade/peso: Acima de 10 kg < de 2 anos; Medicamento: Albendazol 400 mg; Posologia: 5 ml VO 12/12h; Duração: 3 dias.
c) Doença: Estrongiloidíase; Idade/peso: Acima de 10 kg > de 2 anos; Medicamento: Metronidazol 40 mg/ml; Posologia: 1 cp VO/dia; Duração: 5 dias.
d) Nenhuma das alternativas.

19) A respeito da assistência ao o recém-nascido (RN) com necessidade de reanimação assinale a alternativa CORRETA:

- a) Ventilação com balão e cânula traqueal: Para a realização da ventilação com pressão positiva, aplica-se a máscara conectada ao balão auto-inflável sobre a face do RN. A pressão a ser aplicada deve ser individualizada para que o RN alcance e mantenha FC >100bpm. De modo geral, deve-se iniciar com pressão inspiratória ao redor de 20cmH₂O, podendo raramente alcançar 30-40cmH₂O nos RN com pulmões muitos imaturos ou muito doentes. É obrigatória a monitoração da pressão oferecida pelo balão por meio de manômetro. A ventilação é feita na frequência de 40 a 60 movimentos/minuto, de acordo com a regra prática “aperta/solta/solta/aperta...”
b) Ventilação com balão e máscara facial: As situações mais frequentes para indicação de intubação oro traqueal incluem: ventilação com máscara facial inefetiva, ou seja, se após a correção de possíveis problemas técnicos relacionados ao seu uso não há melhora clínica do RN; ventilação com máscara facial prolongada; e necessidade de aplicação de massagem cardíaca e/ou de adrenalina. Além dessas situações, a intubação oro traqueal é obrigatória em RN com algumas anomalias congênitas e deve ser considerada em RN prematuros extremos, que poderão receber surfactante exógeno profilático de acordo com a rotina do serviço.
c) Ventilador manual em T com máscara facial ou cânula traqueal: fixar o fluxo gasoso em 10 L/minuto, limitar a pressão máxima do circuito em 40cmH₂O, selecionar a pressão inspiratória a ser aplicada em cada ventilação, em geral ao redor de 20cmH₂O e ajustar a PEEP em 5 cmH₂O. Após as três primeiras ventilações, reajustar a pressão inspiratória de modo a visualizar o movimento torácico leve e auscultar a entrada de ar nos pulmões. A

concentração de oxigênio inicial depende da idade gestacional: em RN inferior a 34 semanas ajustar em 40% e, em RN de 34 ou mais semanas, começar com ar ambiente. O ajuste da concentração de O₂ necessária deve ser guiado pela oximetria de pulso. Ventilar com frequência de 40 a 60 movimentos por minuto, que pode ser obtida com a regra prática “ocluir a peça em T/soltar/soltar/ocluir...”

- d) Nenhuma das alternativas.

20) A Insuficiência cardíaca congênita é a principal causa de morte, no primeiro ano de vida, com a incidência de 4 a 10 crianças em 1000 nascidos vivos. Assinale verdadeiro(V) e falso (F) sobre a classificação das lesões congênitas acianóticas, de acordo com a sobrecarga fisiológica.

Lesão que produz uma sobrecarga de volume (fluxo sanguíneo aumentado), sendo o denominador comum fisiopatológico nesse grupo a comunicação entre os lados sistêmico e pulmonar da circulação, o que resulta em passagem de sangue completamente oxigenado para o pulmão.

Lesão que inclui obstrução, diminuindo o fluxo sanguíneo pulmonar. Lesões desse grupo incluem atresia tricúspide, tetralogia de Fallot e formas de ventrículo único, com estenose pulmonar.

Lesões em que o fluxo sanguíneo pulmonar permanece aumentado, devido a conexões ventriculares anormais (transposição de grandes vasos) ou mistura de sangue total, que incluem defeitos cardíacos com um átrio ou ventrículo comum, retorno venoso pulmonar anômalo total e tronco arterioso.

Lesão que resulta em sobrecarga de pressão. O denominador comum fisiopatológico é uma obstrução no fluxo sanguíneo normal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) V- V- F- V.
b) V- F- F- V.
c) V- F- V- F.
d) Nenhuma das alternativas.